

Appunti di Aritmetica

Gabriel Antonio Videtta

20 settembre 2022

Indice

1	Teoria degli insiemi	2
1.1	L'operazione di unione	2
1.2	L'operazione di intersezione	2
1.2.1	Relazioni tra l'operazione di intersezione e di unione	3
1.3	L'operazione di sottrazione e di complemento	3
1.3.1	Le leggi di De Morgan	3
1.3.2	La logica affrontata con gli insiemi	4
1.4	Il prodotto cartesiano	4
2	Relazioni di equivalenza e applicazioni	5
2.1	Le relazioni di equivalenza	5
2.1.1	Classi di equivalenza	5
2.2	Le applicazioni	6
2.2.1	Proprietà delle applicazioni	6

Capitolo 1

Teoria degli insiemi

Il concetto di insieme è primitivo e pertanto non definito formalmente in questa sede. Viene tuttavia definita la terminologia che riguarda la teoria dei suddetti insiemi.

Quando si leggerà $a \in S$, s'intenderà che “ a appartiene all'insieme S ”, mentre $a \notin S$ si legge “ a non appartiene all'insieme S ”. Un insieme A si dice sottoinsieme di B ($A \subseteq B$) quando $a \in A \rightarrow a \in B$; in particolare si dice sottoinsieme proprio di B ($A \subset B$) quando $A \subseteq B \wedge \exists b \in B \mid b \notin A$.

Due insiemi A e B sono uguali se e solo se $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$. L'insieme vuoto è l'insieme che non ha elementi, ed è sottoinsieme di ogni insieme.

1.1 L'operazione di unione

L'unione di due insiemi A e B è un'operazione che restituisce un insieme $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.

Tale operazione si può estendere a più insiemi mediante l'introduzione di un *insieme di indici* T per una famiglia di insiemi. Un insieme di indici T rispetto a una famiglia $F = \{A_t\}$ ha la seguente proprietà: $\forall t \in T, \exists A_t \in F$; ossia è in grado di enumerare gli insiemi della famiglia F .

L'unione è pertanto definita su una famiglia F come $\bigcup_{t \in T} A_t = \{x \mid (\exists t \in T \mid x \in A_t)\}$.

L'unione gode delle seguenti proprietà: $A \subseteq B \rightarrow A \cup B = B$ (in particolare, $A \cup \emptyset = A$).

1.2 L'operazione di intersezione

Analogamente a come è stata definita l'unione, l'intersezione è un'operazione che restituisce un insieme $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$; ossia estesa a più insiemi: $\bigcap_{t \in T} A_t = \{x \mid (\forall t \in T \mid x \in A_t)\}$.

In modo opposto all'unione, l'intersezione è tale per cui $A \subseteq B \rightarrow A \cap B = A$ (in particolare, $A \cap \emptyset = \emptyset$).

1.2.1 Relazioni tra l'operazione di intersezione e di unione

Si può facilmente dimostrare la seguente relazione, valida per qualunque scelta di insiemi A , B e C : $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

Dimostrazione. Prima di tutto, un elemento di entrambi i due insiemi appartiene obbligatoriamente a C : nel caso del primo membro, il motivo è banale; riguardo al secondo membro, invece, ci accorgiamo che esso appartiene almeno a uno dei due insiemi dell'unione, riconducendoci a un'intersezione con l'insieme C .

Ogni elemento di $(A \cup B) \cap C$ appartiene inoltre ad almeno A o B , e quindi, appartenendo anche a C , appartiene a $A \cap C$ o $B \cap C$, e quindi a $(A \cap C) \cup (B \cap C)$. Pertanto $(A \cup B) \cap C \subseteq (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

In direzione opposta, ogni elemento di $(A \cap C) \cup (B \cap C)$ appartiene almeno ad uno di dei due insiemi dell'unione. Per appartenere all'intersezione, tale elemento appartiene ad almeno A o B ; e quindi appartiene ad $A \cup B$. Appartenendo anche a C , appartiene anche a $(A \cup B) \cap C$. Quindi $(A \cap C) \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap C$.

Valendo l'inclusione in entrambe le direzioni, $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$. ■

1.3 L'operazione di sottrazione e di complemento

L'operazione di sottrazione su due insiemi A e B è definita come $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$. Si può facilmente verificare che $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$.

Dimostrazione. Ogni elemento di A può appartenere o non appartenere a B : nel primo caso, appartiene anche a $A \cap B$, e quindi a $(A \cap B) \cup (A \setminus B)$; altrimenti appartiene per definizione a $A \setminus B$, e quindi sempre a $(A \cap B) \cup (A \setminus B)$. Pertanto $A \subseteq (A \cap B) \cup (A \setminus B)$.

Ogni elemento di $(A \cap B) \cup (A \setminus B)$ appartiene ad almeno uno dei due operandi dell'unione; in entrambi i casi deve appartenere ad A . Quindi $(A \cap B) \cup (A \setminus B) \subseteq A$. ■

In particolare, se $B \subseteq A$, $A \setminus B$ si dice **complemento di B in A** .

L'operazione di complemento viene indicata con A' qualora sia noto l'universo di riferimento U per cui $A' = U \setminus A$.

1.3.1 Le leggi di De Morgan

Si possono dimostrare le seguenti proprietà:

- $(A \cup B)' = A' \cap B'$
- $(A \cap B)' = A' \cup B'$

Prima legge di De Morgan. Un elemento che appartiene a $(A \cup B)'$ non appartiene né a A né a B , e quindi appartiene sia a A' che a B' , pertanto anche alla loro intersezione $A' \cap B'$ [$(A \cup B)' \subseteq A' \cap B'$].

Allo stesso modo, un elemento di $A' \cap B'$ non appartiene né ad A né a B , e quindi non appartiene ad $A \cup B$, appartenendo dunque a $(A \cup B)'$ [$A' \cap B' \subseteq (A \cup B)'$]. Pertanto $(A \cup B)' = A' \cap B'$. ■

Seconda legge di De Morgan. Un elemento che appartiene a $(A \cap B)'$ può appartenere al più ad A o esclusivamente a B ; pertanto appartiene ad almeno A' o B' , e quindi alla loro unione $[(A \cap B)' \subseteq A' \cup B']$.

Allo stesso modo, un elemento di $A' \cup B'$ appartiene ad almeno A' o B' , e quindi non può appartenere a entrambi A e B , appartenendo dunque a $(A \cap B)'$ $[A' \cup B' \subseteq (A \cap B)']$. Pertanto $(A \cap B)' = A' \cup B'$. ■

1.3.2 La logica affrontata con gli insiemi

In modo veramente interessante, ogni operatore logico segue la logica dell'insiemistica (e viceversa); laddove l'operatore \cup (o \cap) ha una certa proprietà, la soddisfa anche \vee (o \wedge).

Quindi valgono tutte le leggi sopracitate:

- $(a \vee b) \wedge c = (a \wedge c) \vee (b \wedge c)$
- $(a \wedge b) \vee c = (a \vee c) \wedge (b \vee c)$
- $\neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b$
- $\neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b$

1.4 Il prodotto cartesiano

Il prodotto cartesiano di una famiglia ordinata di insiemi F con un certo insieme di indici T è l'insieme $\times_{t \in T} A_t = \{(a_{t_0}, a_{t_1}, \dots) \mid a_{t_0} \in A_{t_0} \wedge a_{t_1} \in A_{t_1} \wedge \dots\}$. In particolare, il prodotto cartesiano di due insiemi A e B si indica con $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$.

Una n -tupla ordinata, ossia la forma in cui è raccolto un certo elemento di un prodotto cartesiano, è uguale ad una altra tupla se e solo se ogni elemento di una tupla è uguale a quello corrispondente in ordine dell'altra: pertanto, in generale, $(a, b) \neq (b, a)$.

Inoltre, il prodotto cartesiano $A \times A$ viene indicato con A^2 (analogamente, $A^n = \times_{i=1}^n A$).

Capitolo 2

Relazioni di equivalenza e applicazioni

2.1 Le relazioni di equivalenza

Utilizzando le nozioni di base della teoria degli insiemi è possibile definire formalmente il concetto di relazione di equivalenza.

Dato un sottoinsieme R di $A \times A$, R si dice relazione di equivalenza se:

- $(a, a) \in R$ (proprietà riflessiva)
- $(a, b) \in R \implies (b, a) \in R$ (proprietà simmetrica)
- $(a, b), (b, c) \in R \implies (a, c) \in R$ (proprietà transitiva)

Tale definizione può essere semplificata implementando l'operazione binaria \sim tale per cui $a \sim b \iff (a, b) \in R$. In questo modo, le condizioni di una relazione di equivalenza R diventano:

- $a \sim a$
- $a \sim b \implies b \sim a$
- $a \sim b \wedge b \sim c \implies a \sim c$

Teorema 2.1.1. *Definita una relazione di equivalenza R con operazione binaria \sim , $a \sim b \wedge c \sim b \implies a \sim c$.*

Dimostrazione. Dalla proprietà riflessiva di R , $c \sim b \implies b \sim c$. Verificandosi sia $a \sim b$ che $b \sim c$, si applica la proprietà transitiva di R , che implica $a \sim c$. ■

2.1.1 Classi di equivalenza

Si definisce classe di equivalenza di a per un certo insieme A e una certa relazione di equivalenza R l'insieme $\text{cl}(a) = \{x \in A \mid a \sim x\}$, ossia l'insieme di tutti i punti che si relazionano ad a mediante tale relazione di equivalenza.

Teorema 2.1.2. *Le classi di equivalenza partizionano l'insieme di relazione in insiemi a due a due disgiunti.*

Dimostrazione. Prima di tutto è necessario dimostrare che l'unione di tutte le classi di equivalenza dà luogo all'insieme di relazione A .

Per ogni elemento $a \in A$, a appartiene a $\text{cl}(a)$ per la proprietà riflessiva di R , ossia della relazione di equivalenza su cui cl è definita. Pertanto $\bigcup_{a \in A} \text{cl}(a)$, che contiene solo elementi di A , è uguale ad A .

In secondo luogo, è necessario dimostrare che le classi di equivalenza sono o disgiunte o identiche. Ponendo l'esistenza di un $a \in \text{cl}(x) \cap \text{cl}(y)$, la dimostrazione deriva dalle proprietà di R : sia $b \in \text{cl}(x)$, allora $b \sim a$; dunque, dal momento che $b \sim a$ e che $a \sim y$, $b \sim y$, ossia $\text{cl}(x) \subseteq \text{cl}(y)$ (analogamente si ottiene $\text{cl}(y) \subseteq \text{cl}(x)$, e quindi $\text{cl}(x) = \text{cl}(y)$). ■

2.2 Le applicazioni

La nozione di applicazione di un insieme in un altro ci permette di generalizzare, ma soprattutto di definire, il concetto di funzione. Dati due insiemi S e T , si dice che σ è un'applicazione da S a T , se $\sigma \subseteq S \times T \wedge \forall s \in S, \exists! t \in T \mid (s, t) \in \sigma$. Tale applicazione allora si scrive come $\sigma : S \rightarrow T$.

Si scrive $\sigma : s \mapsto \sigma(s)$ per sottintendere che $\forall (s, t) \in \sigma, (s, t) = (s, \sigma(s))$.

2.2.1 Proprietà delle applicazioni

Definizione 2.2.1 (Iniettività). Un'applicazione si dice iniettiva se ad ogni immagine è corrisposto al più un elemento, ossia anche che $s_1 \neq s_2 \implies \sigma(s_1) \neq \sigma(s_2)$.

Definizione 2.2.2 (Surgettività). Un'applicazione si dice surgettiva se ad ogni immagine è corrisposto almeno un elemento, ossia anche che $\forall t \in T, \exists s \mid \sigma(s) = t$.

Definizione 2.2.3 (Bigettività). Un'applicazione si dice bigettiva se è sia iniettiva che suriettiva, ossia se $\forall t \in T, \exists! s \in S \mid \sigma(s) = t$.