

# Note del corso di Geometria 1

Gabriel Antonio Videtta

27 e 31 marzo 2023

*Questo avviso sta ad indicare che questo documento è ancora una bozza e non è da intendersi né completo, né revisionato.*

## Proprietà e teoremi principali sul prodotto scalare

**Nota.** Nel corso del documento, per  $V$  si intenderà uno spazio vettoriale di dimensione finita  $n$  e per  $\varphi$  un suo prodotto scalare. Analogamente si intenderà lo stesso per  $V'$  e  $\varphi'$ .

**Proposizione.** (formula delle dimensioni del prodotto scalare) Sia  $W \subseteq V$  un sottospazio di  $V$ . Allora vale la seguente identità:

$$\dim W + \dim W^\perp = \dim V + \dim(W \cap V^\perp).$$

*Dimostrazione.* Si consideri l'applicazione lineare  $f : V \rightarrow W^*$  tale che  $f(\underline{v})$  è un funzionale di  $W^*$  tale che  $f(\underline{v})(\underline{w}) = \varphi(\underline{v}, \underline{w}) \forall \underline{w} \in W$ . Si osserva che  $W^\perp = \text{Ker } f$ , da cui, per la formula delle dimensioni,  $\dim V = \dim W^\perp + \text{rg } f$ . Inoltre, si osserva anche che  $f = i^\top \circ a_\varphi$ , dove  $i : W \rightarrow V$  è tale che  $i(\underline{w}) = \underline{w}$ , infatti  $f(\underline{v}) = a_\varphi(\underline{v}) \circ i$  è un funzionale di  $W^*$  tale che  $f(\underline{v})(\underline{w}) = \varphi(\underline{v}, \underline{w})$ . Pertanto  $\text{rg } f = \text{rg}(i^\top \circ a_\varphi)$ .

Si consideri ora l'applicazione  $g = a_\varphi \circ i : W \rightarrow W^*$ . Sia ora  $\mathcal{B}_W$  una base di  $W$  e  $\mathcal{B}_V$  una base di  $V$ . Allora le matrici associate di  $f$  e di  $g$  sono le seguenti:

$$(i) \quad M_{\mathcal{B}_W^*}^{\mathcal{B}_V}(f) = M_{\mathcal{B}_W^*}^{\mathcal{B}_V}(i^\top \circ a_\varphi) = \underbrace{M_{\mathcal{B}_W^*}^{\mathcal{B}_V}(i^\top)}_A \underbrace{M_{\mathcal{B}_V^*}^{\mathcal{B}_V}(a_\varphi)}_B = AB,$$

$$(ii) \quad M_{\mathcal{B}_V^*}^{\mathcal{B}_W}(g) = M_{\mathcal{B}_V^*}^{\mathcal{B}_W}(a_\varphi \circ i) = \underbrace{M_{\mathcal{B}_V^*}^{\mathcal{B}_V}(a_\varphi)}_B \underbrace{M_{\mathcal{B}_V^*}^{\mathcal{B}_W}(i)}_{A^\top} = BA^\top \stackrel{B^\top=B}{\cong} (AB)^\top.$$

Poiché  $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^\top)$ , si deduce che  $\text{rg}(f) = \text{rg}(g) \implies \text{rg}(i^\top \circ a_\varphi) = \text{rg}(a_\varphi \circ i) = \text{rg}(a_\varphi|_W) = \dim W - \dim \text{Ker } a_\varphi|_W = \dim W - \dim(W \cap \underbrace{\text{Ker } a_\varphi}_{V^\perp}) = \dim W - \dim(W \cap V^\perp)$ . Si conclude allora, sostituendo quest'ultima identità nell'identità ricavata a inizio dimostrazione che  $\dim V = \dim W^\top + \dim W - \dim(W \cap V^\perp)$ , ossia la tesi.  $\square$

**Osservazione.** Si possono fare alcune osservazioni sul radicale di un solo elemento  $\underline{w}$  e su quello del suo sottospazio generato  $W = \text{Span}(\underline{w})$ :

- ▶  $\underline{w}^\perp = W^\perp$ ,
- ▶  $\underline{w} \notin W^\perp \iff \text{Rad}(\varphi|_W) = W \cap W^\perp \iff \underline{w} \text{ non è isotropo} = \{0\} \iff V = W \oplus W^\perp$ .

**Definizione.** Si definisce **base ortogonale** di  $V$  una base  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$  tale per cui  $\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = 0 \iff i \neq j$ , ossia per cui la matrice associata del prodotto scalare è diagonale.

**Proposizione.** (formula di polarizzazione) Se  $\text{char } \mathbb{K} \neq 2$ , un prodotto scalare è univocamente determinato dalla sua forma quadratica  $q$ .

*Dimostrazione.* Si nota infatti che  $q(\underline{v} + \underline{w}) - q(\underline{v}) - q(\underline{w}) = 2\varphi(\underline{v}, \underline{w})$ , e quindi, poiché 2 è invertibile per ipotesi, che  $\varphi(\underline{v}, \underline{w}) = 2^{-1}(q(\underline{v} + \underline{w}) - q(\underline{v}) - q(\underline{w}))$ .  $\square$

**Teorema.** (di Lagrange) Ogni spazio vettoriale  $V$  su  $\mathbb{K}$  tale per cui  $\text{char } \mathbb{K} \neq 2$  ammette una base ortogonale.

*Dimostrazione.* Sia dimostra il teorema per induzione su  $n := \dim V$ . Per  $n \leq 1$ , la dimostrazione è triviale. Sia allora il teorema vero per  $i \leq n$ . Se  $V$  ammette un vettore non isotropo  $\underline{w}$ , sia  $W = \text{Span}(\underline{w})$  e si consideri la decomposizione  $V = W \oplus W^\perp$ . Poiché  $W^\perp$  ha dimensione  $n - 1$ , per ipotesi induttiva ammette una base ortogonale. Inoltre, tale base è anche ortogonale a  $W$ , e quindi l'aggiunta di  $\underline{w}$  a questa base ne fa una base ortogonale di  $V$ . Se invece  $V$  non ammette vettori non isotropi, ogni forma quadratica è nulla, e quindi il prodotto scalare è nullo per la proposizione precedente.  $\square$

**Nota.** D'ora in poi, nel corso del documento, si assumerà  $\text{char } \mathbb{K} \neq 2$ .

**Teorema.** (di Sylvester, caso complesso) Sia  $\mathbb{K}$  un campo i cui elementi sono tutti quadrati di un altro elemento del campo (e.g.  $\mathbb{C}$ ). Allora esiste una base ortogonale  $\mathcal{B}$  tale per cui:

$$M_{\mathcal{B}}(\varphi) = \left( \begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right).$$

*Dimostrazione.* Per il teorema di Lagrange, esiste una base ortogonale  $\mathcal{B}'$  di  $V$ . Si riordini la base in modo tale che la forma quadratica valutata nei primi elementi sia sempre diversa da zero. Allora, poiché ogni elemento di  $\mathbb{K}$  è per ipotesi quadrato di un altro elemento di  $\mathbb{K}$ , si sostituisca  $\mathcal{B}'$  con una base  $\mathcal{B}$  tale per cui, se  $q(\underline{v}_i) = 0$ ,  $\underline{v}_i \mapsto \underline{v}_i$ , e altrimenti  $\underline{v}_i \mapsto \frac{\underline{v}_i}{\sqrt{q(\underline{v}_i)}}$ . Allora  $\mathcal{B}'$  è una base tale per cui la matrice associata del prodotto scalare in tale base è proprio come desiderata nella tesi, dove  $r$  è il numero di elementi tali per cui la forma quadratica valutata in essi sia diversa da zero.  $\square$

**Osservazione.** Si possono effettuare alcune considerazioni sul teorema di Sylvester complesso.

► Si può immediatamente concludere che il rango è un invariante completo per la congruenza in un campo in cui tutti gli elementi sono quadrati, ossia che  $A \cong B \iff \text{rg}(A) = \text{rg}(B)$ , se  $A$  e  $B$  sono matrici simmetriche: infatti ogni matrice simmetrica rappresenta un prodotto scalare, ed è pertanto congruente ad una matrice della forma desiderata nell'enunciato del teorema di Sylvester complesso. Poiché il rango è un invariante della congruenza, si ricava che  $r$  nella forma della matrice di Sylvester, rappresentando il rango, è anche il rango di ogni sua matrice congruente. In particolare, se due matrici simmetriche hanno stesso rango, allora sono congruenti alla stessa matrice di Sylvester, e quindi, essendo la congruenza una relazione di congruenza, sono congruenti a loro volta.

► Due matrici simmetriche con stesso rango, allora, non solo sono SD-equivalenti, ma sono anche congruenti.

► Ogni base ortogonale deve quindi avere lo stesso numero di elementi nulli.

**Definizione.** (somma diretta ortogonale) Siano i sottospazi  $U$  e  $W \subseteq V$  in somma diretta. Allora si dice che  $U$  e  $W$  sono in **somma diretta ortogonale rispetto al prodotto scalare**  $\varphi$  di  $V$ , ossia che  $U \oplus W = U \oplus^\perp W$ , se  $\varphi(\underline{u}, \underline{w}) = 0 \forall \underline{u} \in U, \underline{w} \in W$ .

**Definizione.** (cono isotropo) Si definisce **cono isotropo** di  $V$  rispetto al prodotto scalare  $\varphi$  il seguente insieme:

$$\text{CI}(\varphi) = \{\underline{v} \in V \mid \varphi(\underline{v}, \underline{v}) = 0\},$$

ossia l'insieme dei vettori isotropi di  $V$ .

**Nota.** La notazione  $\varphi > 0$  indica che  $\varphi$  è definito positivo (si scrive  $\varphi \geq 0$  se invece è semidefinito positivo). Analogamente  $\varphi < 0$  indica che  $\varphi$  è definito negativo (e  $\varphi \leq 0$  indica che è semidefinito negativo).

**Esercizio 1.** Sia  $\text{char } \mathbb{K} \neq 2$ . Siano  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k \in V$  e sia  $M = \left( \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) \right)_{i,j=1-k} \in M(k, \mathbb{K})$ , dove  $\varphi$  è un prodotto scalare di  $V$ . Sia inoltre  $W = \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k)$ . Si dimostrino allora le seguenti affermazioni.

- (i) Se  $M$  è invertibile, allora  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$  sono linearmente indipendenti.
- (ii) Siano  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$  linearmente indipendenti. Allora  $M$  è invertibile  $\iff \varphi|_W$  è non degenere  $\iff W \cap W^\perp = \{\underline{0}\}$ .
- (iii) Siano  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$  a due a due ortogonali tra loro. Allora  $M$  è invertibile  $\iff$  nessun vettore  $\underline{v}_i$  è isotropo.
- (iv) Siano  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$  a due a due ortogonali tra loro e siano anche linearmente indipendenti. Allora  $M$  è invertibile  $\implies$  si può estendere  $\mathcal{B}_W = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\}$  a una base ortogonale di  $V$ .
- (v) Sia  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ . Sia inoltre  $\varphi > 0$ . Allora  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$  sono linearmente indipendenti  $\iff M$  è invertibile.
- (vi) Sia  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ . Sia ancora  $\varphi > 0$ . Allora se  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$  sono a due a due ortogonali e sono tutti non nulli, sono anche linearmente indipendenti.

*Soluzione.*

- (i) Siano  $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{K}$  tali che  $a_1 \underline{v}_1 + \dots + a_k \underline{v}_k = \underline{0}$ . Vale in particolare che  $\underline{0} = \varphi(\underline{v}_i, \underline{0}) = \varphi(\underline{v}_i, a_1 \underline{v}_1 + \dots + a_k \underline{v}_k) = \sum_{j=1}^k a_j \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) \forall 1 \leq i \leq k$ . Allora  $\sum_{j=1}^k a_j M^j = \underline{0}$ . Dal momento che  $M$  è invertibile,  $\text{rg}(M) = k$ , e quindi l'insieme delle colonne di  $M$  è linearmente indipendente, da cui si ricava che  $a_j = 0 \forall 1 \leq j \leq k$ , e quindi che  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$  sono linearmente indipendenti.
- (ii) Poiché  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$  sono linearmente indipendenti, tali vettori formano una base di  $W$ , detta  $\mathcal{B}$ . In particolare, allora, vale che  $M = M_{\mathcal{B}}(\varphi|_W)$ . Pertanto, se  $M$  è invertibile,  $\text{Rad}(\varphi|_W) = \text{Ker } M = \{\underline{0}\}$ , e dunque  $\varphi|_W$  è non degenere. Se invece  $\varphi|_W$  è non degenere,  $\{\underline{0}\} = \text{Rad}(\varphi|_W) = W \cap W^\perp$ . Infine, se  $W \cap W^\perp = \{\underline{0}\}$ ,  $\{\underline{0}\} = W \cap W^\perp = \text{Rad}(\varphi|_W) = \text{Ker } M$ , e quindi  $M$  è iniettiva, e dunque invertibile.

- (iii) Dal momento che  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$  sono ortogonali tra loro,  $M$  è una matrice diagonale. Pertanto  $M$  è invertibile se e solo se ogni suo elemento diagonale è diverso da 0, ossia se  $\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_i) \neq 0 \forall 1 \leq i \leq k$ , e dunque se e solo se nessun vettore  $\underline{v}_i$  è isotropo.
- (iv) Se  $M$  è invertibile, da (ii) si deduce che  $\text{Rad}(\varphi|_W) = W \cap W^\perp = \{\underline{0}\}$ , e quindi che  $W$  e  $W^\perp$  sono in somma diretta. Inoltre, per la formula delle dimensioni del prodotto scalare,  $\dim W + \dim W^\perp = \dim V + \underbrace{\dim(W \cap W^\perp)}_{\leq \dim(W \cap W^\perp) = 0}$ . Pertanto  $V = W \oplus^\perp W^\perp$ .

Allora, dacché  $\text{char } \mathbb{K} \neq 2$ , per il teorema di Lagrange,  $W^\perp$  ammette una base ortogonale  $\mathcal{B}_{W^\perp}$ . Si conclude dunque che  $\mathcal{B} = \mathcal{B}_W \cup \mathcal{B}_{W^\perp}$  è una base ortogonale di  $V$ .

- (v) Se  $M$  è invertibile, da (i)  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$  sono linearmente indipendenti. Siano ora invece  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$  linearmente dipendenti per ipotesi. Siano  $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{K}$  tali che  $a_1 M^1 + \dots + a_k M^k = 0$ , allora  $a_1 \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_1) + \dots + a_k \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_k) = 0 \forall 1 \leq i \leq k$ . Pertanto, detto  $\underline{v} = a_1 \underline{v}_1 + \dots + a_k \underline{v}_k$ , si ricava che:

$$\varphi(\underline{v}, \underline{v}) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k a_j \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = 0.$$

Tuttavia questo è possibile solo se  $\underline{v} = a_1 \underline{v}_1 + \dots + a_k \underline{v}_k = 0$ . Dal momento che  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$  sono linearmente indipendenti, si conclude che  $a_1 = \dots = a_k = 0$ , ossia che le colonne di  $M$  sono tutte linearmente indipendenti e quindi che  $\text{rg}(M) = k \implies M$  è invertibile.

- (vi) Poiché  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$  sono ortogonali a due a due tra loro,  $M$  è una matrice diagonale. Inoltre, dacché  $\varphi > 0$  e  $\underline{v}_i \neq \underline{0} \forall 1 \leq i \leq k$ , gli elementi diagonali di  $M$  sono sicuramente tutti diversi da zero, e quindi  $\det(M) \neq 0 \implies M$  è invertibile. Allora, per il punto (v),  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$  sono linearmente indipendenti.

**Definizione.** Data una base ortogonale  $\mathcal{B}$  di  $V$  rispetto al prodotto scalare  $\varphi$ , si definiscono i seguenti indici:

$$\begin{aligned}
\iota_+(\varphi) &= \max\{\dim W \mid W \subseteq V \text{ e } \varphi|_W > 0\}, & \text{(indice di positività)} \\
\iota_-(\varphi) &= \max\{\dim W \mid W \subseteq V \text{ e } \varphi|_W < 0\}, & \text{(indice di negatività)} \\
\iota_0(\varphi) &= \dim V^\perp & \text{(indice di nullità)}
\end{aligned}$$

Quando il prodotto scalare  $\varphi$  è noto dal contesto, si omette e si scrive solo  $\iota_+$ ,  $\iota_-$  e  $\iota_0$ . In particolare, la terna  $\sigma = (i_+, i_-, i_0)$  è detta **segnatura** del prodotto  $\varphi$ .

**Teorema.** (di Sylvester, caso reale) Sia  $\mathbb{K}$  un campo ordinato i cui elementi positivi sono tutti quadrati (e.g.  $\mathbb{R}$ ). Allora esiste una base ortogonale  $\mathcal{B}$  tale per cui:

$$M_{\mathcal{B}}(\varphi) = \left( \begin{array}{c|c|c} I_{\iota_+} & 0 & 0 \\ \hline 0 & -I_{\iota_-} & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 \cdot I_{\iota_0} \end{array} \right).$$

Inoltre, per ogni base ortogonale, esistono esattamente  $\iota_+$  vettori della base con forma quadratica positiva,  $\iota_-$  con forma negativa e  $\iota_0$  con forma nulla.

*Dimostrazione.* Per il teorema di Lagrange, esiste una base ortogonale  $\mathcal{B}'$  di  $V$ . Si riordini la base in modo tale che la forma quadratica valutata nei primi elementi sia strettamente positiva, che nei secondi elementi sia strettamente negativa e che negli ultimi sia nulla. Si sostituisca  $\mathcal{B}'$  con una base  $\mathcal{B}$  tale per cui, se  $q(\underline{v}_i) > 0$ , allora  $\underline{v}_i \mapsto \frac{\underline{v}_i}{\sqrt{q(\underline{v}_i)}}$ ; se  $q(\underline{v}_i) < 0$ , allora  $\underline{v}_i \mapsto \frac{\underline{v}_i}{\sqrt{-q(\underline{v}_i)}}$ ; altrimenti  $\underline{v}_i \mapsto \underline{v}_i$ . Si è allora trovata una base la cui matrice associata del prodotto scalare è come desiderata nella tesi.

Sia ora  $a$  il numero di vettori della base con forma quadratica positiva,  $b$  il numero di vettori con forma negativa e  $c$  quello dei vettori con forma nulla. Si consideri  $W_+ = \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_a)$ ,  $W_- = \text{Span}(\underline{v}_{a+1}, \dots, \underline{v}_b)$ ,  $W_0 = \text{Span}(\underline{v}_{b+1}, \dots, \underline{v}_c)$ .

Sia  $M = M_{\mathcal{B}}(\varphi)$ . Si osserva che  $c = n - \text{rg}(M) = \dim \text{Ker}(M) = \dim V^\perp = \iota_0$ . Inoltre  $\forall \underline{v} \in W_+$ , dacché  $\mathcal{B}$  è ortogonale,  $q(\underline{v}) = q(\sum_{i=1}^a \alpha_i \underline{v}_i) = \sum_{i=1}^a \alpha_i^2 q(\underline{v}_i) > 0$ , e quindi  $\varphi|_{W_+} > 0$ , da cui  $\iota_+ \geq a$ . Analogamente  $\iota_- \geq b$ .

Si mostra ora che è impossibile che  $\iota_+ > a$ . Se così infatti fosse, sia  $W$  tale che  $\dim W = \iota_+$  e che  $\varphi|_W > 0$ .  $\iota_+ + b + c$  sarebbe maggiore di  $a + b + c = n := \dim V$ . Quindi, per la formula di Grassman,  $\dim(W + W_- +$

$W_0) = \dim W + \dim(W_- + W_0) - \dim(W \cap (W_- + W_0)) \implies \dim(W \cap (W_- + W_0)) = \dim W + \dim(W_- + W_0) - \dim(W + W_- + W_0) > 0$ , ossia esisterebbe  $\underline{v} \neq \underline{0} \mid \underline{v} \in W \cap (W_- + W_0)$ . Tuttavia questo è assurdo, dacché dovrebbe valere sia  $q(\underline{v}) > 0$  che  $q(\underline{v}) < 0$ ,  $\zeta$ . Quindi  $\iota_+ = a$ , e analogamente  $\iota_- = b$ .  $\square$

**Definizione.** Si dice **base di Sylvester** una base di  $V$  tale per cui la matrice associata di  $\varphi$  sia esattamente nella forma vista nella dimostrazione del teorema di Sylvester. Analogamente si definisce tale matrice come **matrice di Sylvester**.

**Osservazione.**

► Si può dunque definire la segnatura di una matrice simmetrica come la segnatura di una qualsiasi sua base ortogonale, dal momento che tale segnatura è invariante per cambiamento di base.

► La segnatura è un invariante completo per la congruenza nel caso reale. Se infatti due matrici hanno la stessa segnatura, sono entrambe congruenti alla matrice come vista nella dimostrazione della forma reale del teorema di Sylvester, e quindi, essendo la congruenza una relazione di equivalenza, sono congruenti tra loro. Analogamente vale il viceversa, dal momento che ogni base ortogonale di due matrici congruenti devono contenere gli stessi numeri  $\iota_+$ ,  $\iota_-$  e  $\iota_0$  di vettori di base con forma quadratica positiva, negativa e nulla.

► Se  $\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_k$  sono tutti i vettori di una base ortogonale  $\mathcal{B}$  con forma quadratica nulla, si osserva che  $W = \text{Span}(\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_k)$  altro non è che  $V^\perp$  stesso. Infatti, come visto anche nella dimostrazione del teorema di Sylvester reale, vale che  $\dim W = \dim \text{Ker}(M_{\mathcal{B}}(\varphi)) = \dim V^\perp$ . Inoltre, se  $\underline{w} \in W$  e  $\underline{v} \in V$ ,  $\varphi(\underline{w}, \underline{v}) = \varphi(\sum_{i=1}^k \alpha_i \underline{w}_i, \sum_{i=1}^k \beta_i \underline{w}_i + \sum_{i=k+1}^n \beta_i \underline{v}_i) = \sum_{i=1}^k \alpha_i \beta_i q(\underline{w}_i) = 0$ , e quindi  $W \subseteq V^\perp$ , da cui si conclude che  $W = V^\perp$ .

► Vale in particolare che  $\text{rg}(\varphi) = \iota_+ + \iota_-$ , mentre  $\dim \text{Ker}(\varphi) = \iota_0$ , e quindi  $n = \iota_+ + \iota_- + \iota_0$ .

**Definizione.** (isometria) Dati due spazi vettoriali  $(V, \varphi)$  e  $(V', \varphi')$  dotati di prodotto scalare sullo stesso campo  $\mathbb{K}$ , si dice che  $V$  e  $V'$  sono **isometrici** se esiste un isomorfismo  $f$ , detto *isometria*, che preserva tali che prodotti, ossia tale che:

$$\varphi(\underline{v}, \underline{w}) = \varphi'(f(\underline{v}), f(\underline{w})).$$

**Esercizio 2.** Sia  $f : V \rightarrow V'$  un isomorfismo. Allora  $f$  è un'isometria  $\iff \forall$  base  $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$  di  $V$ ,  $\mathcal{B}' = \{f(\underline{v}_1), \dots, f(\underline{v}_n)\}$  è una

base di  $V'$  e  $\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \varphi'(f(\underline{v}_i), f(\underline{v}_j)) \forall 1 \leq i, j \leq n \iff \exists$  base  $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$  di  $V$  tale che  $\mathcal{B}' = \{f(\underline{v}_1), \dots, f(\underline{v}_n)\}$  è una base di  $V'$  e  $\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \varphi'(f(\underline{v}_i), f(\underline{v}_j)) \forall 1 \leq i, j \leq n$ .

*Soluzione.* Se  $f$  è un'isometria, detta  $\mathcal{B}$  una base di  $V$ ,  $\mathcal{B}' = f(\mathcal{B})$  è una base di  $V'$  dal momento che  $f$  è anche un isomorfismo. Inoltre, dacché  $f$  è un'isometria, vale sicuramente che  $\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \varphi'(f(\underline{v}_i), f(\underline{v}_j)) \forall 1 \leq i, j \leq n$ .

Sia ora assunto per ipotesi che  $\forall$  base  $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$  di  $V$ ,  $\mathcal{B}' = \{f(\underline{v}_1), \dots, f(\underline{v}_n)\}$  è una base di  $V'$  e  $\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \varphi'(f(\underline{v}_i), f(\underline{v}_j)) \forall 1 \leq i, j \leq n$ . Allora, analogamente a prima, detta  $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$  una base di  $V$ ,  $\mathcal{B}' = f(\mathcal{B})$  è una base di  $V'$ , e in quanto tale, per ipotesi, è tale che  $\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \varphi'(f(\underline{v}_i), f(\underline{v}_j)) \forall 1 \leq i, j \leq n$ .

Sia infine assunto per ipotesi che  $\exists$  base  $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$  di  $V$  tale che  $\mathcal{B}' = \{f(\underline{v}_1), \dots, f(\underline{v}_n)\}$  è una base di  $V'$  e  $\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \varphi'(f(\underline{v}_i), f(\underline{v}_j)) \forall 1 \leq i, j \leq n$ . Siano  $\underline{v}, \underline{w} \in V$ . Allora  $\exists a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{K}$  tali che  $\underline{v} = a_1 \underline{v}_1 + \dots + a_n \underline{v}_n$  e  $\underline{w} = b_1 \underline{v}_1 + \dots + b_n \underline{v}_n$ . Si ricava pertanto che:

$$\varphi'(f(\underline{v}), f(\underline{w})) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j \varphi'(f(\underline{v}_i), f(\underline{v}_j)) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j \varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \varphi(\underline{v}, \underline{w}),$$

da cui la tesi.

**Proposizione.** Sono equivalenti le seguenti affermazioni:

- (i)  $V$  e  $V'$  sono isometrici;
- (ii)  $\forall$  base  $\mathcal{B}$  di  $V$ , base  $\mathcal{B}'$  di  $V'$ ,  $M_{\mathcal{B}}(\varphi)$  e  $M_{\mathcal{B}'}(\varphi')$  sono congruenti;
- (iii)  $\exists$  base  $\mathcal{B}$  di  $V$ , base  $\mathcal{B}'$  di  $V'$  tale che  $M_{\mathcal{B}}(\varphi)$  e  $M_{\mathcal{B}'}(\varphi')$  sono congruenti.

*Dimostrazione.* Se  $V$  e  $V'$  sono isometrici, sia  $f : V \rightarrow V'$  un'isometria. Sia  $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$  una base di  $V$ . Allora, poiché  $f$  è anche un isomorfismo,  $\mathcal{B}' = f(\mathcal{B})$  è una base di  $V'$  tale che  $\varphi(\underline{v}_i, \underline{v}_j) = \varphi'(f(\underline{v}_i), f(\underline{v}_j)) \forall 1 \leq i, j \leq n$ . Pertanto  $M_{\mathcal{B}}(\varphi) = M_{\mathcal{B}'}(\varphi')$ . Si conclude allora che, cambiando base in  $V$  (o in  $V'$ ), la matrice associata al prodotto scalare varia per congruenza dalla formula di cambiamento di base per il prodotto scalare, da cui si ricava che per ogni scelta di  $\mathcal{B}$  base di  $V$  e di  $\mathcal{B}'$  base di  $V'$ ,  $M_{\mathcal{B}}(\varphi) \cong M_{\mathcal{B}'}(\varphi')$ . Inoltre, se tale risultato è vero per ogni  $\mathcal{B}$  base di  $V$  e di  $\mathcal{B}'$  base di  $V'$ , dal momento



che sicuramente esistono due basi  $\mathcal{B}$ ,  $\mathcal{B}'$  di  $V$  e  $V'$ , vale anche (ii)  $\implies$  (iii).

Si dimostra ora (iii)  $\implies$  (i). Per ipotesi  $M_{\mathcal{B}}(\varphi) \cong M_{\mathcal{B}'}(\varphi')$ , quindi  $\exists P \in \text{GL}(n, \mathbb{K}) \mid M_{\mathcal{B}'}(\varphi') = P^\top M_{\mathcal{B}}(\varphi) P$ . Allora  $\exists \mathcal{B}''$  base di  $V'$  tale che  $P = M_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'}(Id_V)$ , da cui  $P^{-1} = M_{\mathcal{B}''}^{\mathcal{B}'}(\varphi)$ . Per la formula di cambiamento di base del prodotto scalare,  $M_{\mathcal{B}''}(\varphi) = (P^{-1})^\top M_{\mathcal{B}'} P^{-1} = M_{\mathcal{B}}(\varphi)$ . Detta  $\mathcal{B}'' = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n\}$ , si costruisce allora l'isomorfismo  $f : V \rightarrow V'$  tale che  $f(v_i) = \underline{w}_i \forall 1 \leq i \leq n$ . Dal momento che per costruzione  $M_{\mathcal{B}}(\varphi) = M_{\mathcal{B}''}(\varphi')$ ,  $\varphi(v_i, v_j) = \varphi'(\underline{w}_i, \underline{w}_j) = \varphi'(f(v_i), f(v_j)) \forall 1 \leq i, j \leq n$ . Si conclude dunque che  $\varphi(\underline{v}, \underline{w}) = \varphi'(f(\underline{v}), f(\underline{w})) \forall \underline{v}, \underline{w} \in V$ , e dunque che  $f$  è un'isometria, come desiderato dalla tesi.  $\square$

**Proposizione.**  $(V, \varphi)$  e  $(V', \varphi')$  spazi vettoriali su  $\mathbb{R}$  sono isometrici  $\iff \varphi$  e  $\varphi'$  hanno la stessa segnatura.

*Dimostrazione.*

( $\implies$ ) Per la precedente proposizione, esistono due basi  $\mathcal{B}$  e  $\mathcal{B}'$ , una di  $V$  e una di  $V'$ , tali che  $M_{\mathcal{B}}(\varphi) \cong M_{\mathcal{B}'}(\varphi')$ . Allora queste due matrici condividono la stessa segnatura.

( $\impliedby$ ) Siano  $\mathcal{B}$ ,  $\mathcal{B}'$  basi di Sylvester di  $V$  e di  $V'$ . Si definisce allora l'applicazione  $f : V \rightarrow V'$  tale che  $f(\underline{v}_i) = \underline{w}_i$ : essa è un'isometria.  $\square$

**Corollario.** Due matrici simmetriche sono congruenti se e solo se hanno la stessa segnatura.

**Osservazione.**

► se  $V = U \oplus^\perp W$ , allora  $\iota_+(\varphi) = \iota_+(\varphi|_U) + \iota_+(\varphi|_W)$ , e analogamente per gli altri indici.

**Esempio.** Per  $\varphi = x_1y_1 + x_2y_2 - x_3y_3$ .

**Definizione.** Sia  $\mathbb{K}$  qualunque.  $W \subseteq V$  si dice sottospazio isotropo se  $\varphi|_W = 0$ .

**Osservazione.**

- $V^\perp$  è isotropo,
- $\underline{v}$  è un vettore isotropo  $\iff W = \text{Span}(\underline{v})$  è sottospazio isotropo,
- $W \subseteq V$  è isotropo  $\iff W \subseteq W^\perp$ .

**Proposizione.** Sia  $\varphi$  non degenera.  $W \subseteq V$  isotropo, allora  $\dim W \leq \frac{1}{2} \dim V$ .

*Dimostrazione.*  $W \subseteq W^\perp \implies \dim W \leq \dim W^\perp \implies \dim W \leq \dim V - \dim W \implies \dim W \leq \frac{1}{2} \dim V.$   $\square$

**Definizione.** Si definisce **indice di Witt**  $W(\varphi)$  di  $(V, \varphi)$  come la massima dimensione di un sottospazio isotropo.

**Osservazione.**

► Se  $\varphi > 0$ ,  $W(\varphi) = 0$ .

**Proposizione.** Per  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  e  $\sigma(\varphi) = (\iota_+(\varphi), \iota_-(\varphi), \iota_0(\varphi))$ , con  $\varphi$  non degenera,  $W(\varphi) = \min\{\iota_+(\varphi), \iota_-(\varphi)\}$ .

*Dimostrazione.* Sia ad esempio  $\iota_-(\varphi) \leq \iota_+(\varphi)$ . Se  $W$  è un sottospazio con  $\dim W > \iota_-(\varphi)$ , e  $W^+$  è un sottospazio con  $\dim W^+ = \iota_+(\varphi)$  e  $\varphi|_{W^+} > 0 \implies \dim(W \cap W^+) > 0$ , e quindi  $W$  non è isotropo (quindi  $W(\varphi) < \iota_-(\varphi)$ ).

Sia  $\mathcal{B}$  una base di Sylvester. Per costruirlo prendi coppie della base originale facendo la differenza e nota che ne prendi esattamente quante iota-.  $\square$